

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CANIQUANTEL PLUS XL ochucené tablety

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Euracon pharma Consulting & Trading GmbH
Max-Planck-Strasse 11
D-85716 Unterschleissheim, Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Heinz-Haupt Pharma Berlin GmbH
Gradestrasse 13, 12347 Berlin, Německo

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CANIQUANTEL PLUS XL ochucené tablety

Praziquantelum
Fenbendazolium

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 tabletě:

Léčivé látky:

Praziquantelum	100 mg
Fenbendazolium	1 000 mg

4. INDIKACE

Léčba nejdůležitějších cestodóz a nematodóz u psa:

Škrkavky: *Toxacara canis*, *Toxascaris leonina*

Měchovci: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*

Tenkohlavci: *Trichuris vulpis*

Tasemnice: *Echinococcus* spp., *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Mesocestoides* spp.

5. KONTRAINDIKACE

Pro nedostatek informací o podání Caniquantel Plus XL ochucené tablety březím fenám se nedoporučuje přípravek podávat březím fenám a štěňatům do věku 3 týdnů.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoli závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Doporučená dávka je 5 mg praziquantelu a 50 mg fenbendazolu na 1 kg ž.hm.

To odpovídá 1 tabletě Caniquantel Plus XL ochucené tablety na 20 kg živé hmotnosti nebo polovině tablety na 10 kg ž.hm.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tableta se podává přímo do úst nebo zamíchaná v krmivu. Není nutné hladovění nebo dietní opatření.

Pro účinné ošetření při silném výskytu nematodóz se doporučuje tablety aplikovat po 2 až 3 po sobě následující dny.

Při výskytu škrkavek u štěňat by se nemělo počítat pouze s jedním odčervením, ale mělo by se v intervalu 14 dnů několikrát zopakovat.

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Doba použitelnosti rozpuštěné tablety: 24 hodin

Nespotřebovanou půlku tablety vložte zpět do blistru.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedeno po EXP.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Rezistence parazitů vůči kterékoli skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

Ve studii tolerance bylo psům podávané 3-5 násobné množství doporučené dávky tablet Caniquantel plus ochucené ve dvojnásobné delším čase aplikace. To zodpovídá 1,5 a 2,5 násobnému předávkování tabletami Caniquantel plus XL.

V klinických nebo klinicko-patologických pokusech nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky.

Občasné reakce vymizí velmi rychle bez léčebného zákroku.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

červen 2011

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení:

Blistr (PVC/Al) se 3 tabletami, vnější přebal papírová skládačka.
2 x 3 tablety, 20 x 3 tablety.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.