

**РЕКОМЕНДАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦАМ ПО ЛЕЧЕНИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА
ВНИМАНИЕ, КОЛЛЕГИ! ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ – ОБРАЗЕЦ!
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СОСТАВЛЯЕТ ТОЛЬКО
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ!**

Инсулин (указываем название препарата) - по ___ МЕ подкожно, лучше во внутреннюю поверхность бедра, если не получается, то можно и подкожно в холку - СТРОГО 2 РАЗА (ИЛИ 1 РАЗ) В СУТКИ. ПОСТОЯННО И НАВСЕГДА!!! ПРЕРЫВАНИЕ КУРСА ИНСУЛИНОТЕРАПИИ НЕДОПУСТИМО НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ДАЖЕ САМЫХ ВАЖНЫХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Утро: указываем время - ИНСУЛИН - ___ МЕ - ПЛК, ЧЕРЕЗ 15-20 МИНУТ - 1/2 суточной дозировки корма.

Вечер: указываем время - ИНСУЛИН - ___ МЕ - ПЛК, ЧЕРЕЗ 15-20 МИНУТ - 1/2 суточной дозировки корма.

- СУТОЧНУЮ ДОЗИРОВКУ НЕ ПРЕВЫШАТЬ! ВОДА КИПЯЧЕНАЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ.

- КРОМЕ ОСНОВНОГО КОРМА (РАЦИОНА) НИКАКОЙ ДРУГОЙ ЕДЫ ЖИВОТНОМУ НЕ ДАВАТЬ! ПОДКОРМ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

- НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИИ ИНСУЛИНА ЖИВОТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКУШАЛО!!!! ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ, ТО ЕГО СЛЕДУЕТ НАКОРМИТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО!!!

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УГОЩАТЬ КАКИМИ-ЛИБО ЛАКОМСТВАМИ, ДОМАШНЕЙ ЕДОЙ ИЛИ ПОСТРОННИМИ КОРМАМИ!!!! КОРМЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТРОГО ПО ВРЕМЕНИ И ТОЛЬКО ПРИВЫЧНЫМ КОРМОМ.

- ИНОГДА ВСЛЕДСТВИЕ СИСТЕМНЫХ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ЖИВОТНЫХ В ПРОЦЕССЕ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ В ВИДЕ СКАЧКОВ УРОВНЯ САХАРА В КРОВИ, ЧТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ ШОКОВЫМ СОСТОЯНИЕМ (СУДОРОГИ, ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, СЛЮНОТЕЧЕНИЕ, НАРУШЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ И ДР.) ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИЧИНОЙ ПОДОБНОГО СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ САХАРА В КРОВИ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ЖИВОТНОМУ НУЖНО ВЫПОИТЬ КИПЯЧЕНУЮ ВОДУ С САХАРОМ ИЛИ ПРОСТО ПРОВЕСТИ ОРОШЕНИЕ ДЕСЕН ЭТОЙ ВОДОЙ (приблизительное количество рассчитывается врачом исходя из массы тела пациента). ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ ДОСТАВИТЬ ЖИВОТНОЕ В ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРЕДУПРЕДИВ ВРАЧА ПО ТЕЛЕФОНУ (ЧТОБЫ ВРАЧ МОГ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВСТРЕЧЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО).

Плановый контроль состояния кота/собаки врачом должен проводиться (даже в случае отсутствия осложнений и нормального течения инсулинотерапии) - 1 раз в 3 месяца. Он включает:

- подробный сбор анамнеза и клинический осмотр.
- измерение уровня глюкозы в крови на фоне инсулинотерапии (3 раза в день в течение 2-3 дней).
- контроль уровня креатинина крови и клинический анализ мочи (оценка функции почек);
- контроль массы тела кота (для коррекции дозировки корма и инсулина);
- общий контроль (жалобы владельцев, их наблюдения и замечания по поводу состояния кота).

ДИАБЕТ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ИЗЛЕЧИМ. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ - ПРОДЛЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИВОТНОГО!